

Direttore Scientifico
Maurizio Rossini

Comitato Scientifico
Francesco Bertoldo
Rachele Ciccocioppo
Andrea Fagiolini
Davide Gatti
Sandro Giannini
Paolo Gisondi
Andrea Giusti
Giovanni Iolascon
Stefano Lello
Diego Peroni
Gianenrico Senna
Pasquale Strazzullo
Giovanni Targher
Leonardo Triggiani

Assistente Editoriale
Sara Rossini

Copyright by
Pacini Editore srl

Direttore Responsabile
Patrizia Pacini

Edizione
Pacini Editore Srl
Via Gherardesca 1 • 56121 Pisa
Tel. 050 313011 • Fax 050 3130300
Info@pacinieditore.it • www.pacinieditore.it

Divisione Pacini Editore Medicina
Fabio Poponcini • Business Unit Manager
Tel. 050 31 30 218 • fpoponcini@pacinieditore.it
Alessandra Crosato • Account Manager
Tel. 050 31 30 239 • acrosato@pacinieditore.it
Francesca Gori • Business Development &
Scientific Editorial Manager
fgori@pacinieditore.it
Manuela Mori • Digital Publishing & Advertising
Tel. 050 31 30 217 • mmori@pacinieditore.it

Redazione
Lucia Castelli
Tel. 050 3130224 • lcastelli@pacinieditore.it

Stampa
Industrie Grafiche Pacini • Pisa

ISSN: 2611-2876 (online)

Registrazione presso il Tribunale di Pisa n. 2/18 del 23-2-2018
L'editore resta a disposizione degli aventi diritto con i quali non è stato possibile comunicare e per le eventuali omissioni. Le fotocopie per uso personale del lettore (per propri scopi di lettura, studio, consultazione) possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico, escluse le pagine pubblicitarie, dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dalla Legge n. 633 del 1941 e a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi: <https://www.clearedi.org>. Edizione digitale - Giugno 2024.

Maurizio Rossini

Dipartimento di Medicina,
Sezione di Reumatologia, Università di Verona

Cari Lettori

in questo numero torniamo a parlare di carenza di vitamina D in età pediatrica, la cui prevalenza è tornata ad aumentare in alcuni Paesi, come documentato in Inghilterra. Sì, perché come scrive l'Autore dell'articolo a cui abbiamo affidato il compito di un aggiornamento in questo campo, sono cambiati e diventati più frequenti alcuni fattori di rischio come la composizione etnica e il sovrappeso. È aumentata in Europa la popolazione con colorito della pelle più scuro o con abitudini culturali quali la copertura estrema per motivi religiosi, fattori che com'è noto ostacolano la produzione endogena di vitamina D tramite l'esposizione solare. Ma anche la prevalenza del sovrappeso è arrivata al 30% della popolazione pediatrica, condizione anche questa che rappresenta un importante fattore di rischio per ipovitaminosi D e che richiede notoriamente una supplementazione con dosi maggiori, specie se si tratta di obesità. Al fine di assicurare un adeguato sviluppo scheletrico ma anche per probabili benefici extra-scheletrici, si ricorda quindi come sia importante assicurare un adeguato stato vitaminico D nelle varie fasi della crescita, necessariamente ricorrendo a supplementazione specie nei primi anni di vita e se la madre era in condizioni di ipovitaminosi D. In età pediatrica l'Autore sottolinea e documenta come le dosi di vitamina D debbano essere assunte quotidianamente e non in bolo mensile o settimanale, probabilmente perché alte dosi in bolo possono indurre l'espressione di enzimi del catabolismo inattivanti la vitamina D, come anche da noi ipotizzato sulla base dei risultati di un nostro recente studio sulla farmacocinetica¹. In un precedente numero di questa rivista² avevamo anche proposto una giustificazione farmacocinetica e farmacodinamica a supporto degli esclusivi benefici, in particolare extrascheletrici, riportati con la somministrazione quotidiana di colecalciferolo.

Nell'altro articolo ho chiesto agli Autori di fare il punto su una possibile correlazione tra carenza di vitamina D e sindrome dolorosa regionale complessa, più praticamente definita algodistrofia, essendo recentemente stato riportato che pazienti con frattura di radio distale complicata da sindrome algodistrofica presentavano concentrazioni plasmatiche di vitamina D significativamente inferiori rispetto a coloro che non erano andati incontro a questa complicanza. Sulla base delle evidenze disponibili, come vedrete, gli Autori riconoscono che la carenza di vitamina D possa predisporre a un aumentato rischio di sindrome algodistrofica sostanzialmente per due motivi: il primo perché in grado di determinare, anche per il connesso rischio di caduta, un aumento di eventi fratturativi, specie di quelli intra-articolari, predisponenti la sindrome. Il secondo motivo potrebbe essere rappresentato dal fatto che l'ipovitaminosi D rappresenta una condizione predisponente la neuroflogosi e un assetto immunologico proflogogeno, entrambi coinvolti nella patogenesi della sindrome algodistrofica. A riprova di un possibile nesso causale tra livelli di vitamina D e di citochine proflogogene, ricordano studi che dimostrano come la supplementazione vitaminica D sia in grado di ridurre la concentrazione sierica di TNFalfa e di IL-6, oltre che di IL-17, come da noi osservato in un recente studio³. Da ciò

Corrispondenza

Maurizio Rossini
maurizio.rossini@univr.it

How to cite this article: Rossini M. Editoriale. Vitamin D - UpDates 2024;7(2):40-41.

© Copyright by Pacini Editore srl



L'articolo è open access e divulgato sulla base della licenza CC-BY-NC-ND (Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale). L'articolo può essere usato indicando la menzione di paternità adeguata e la licenza; solo a scopi non commerciali; solo in originale. Per ulteriori informazioni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it>

2024;7(2):40-41

l'ipotesi che una supplementazione con vitamina D possa contribuire a determinare un beneficio aggiuntivo o più rapido del noto approccio terapeutico dell'algodistrofia con neridronato. Probabilmente contribuirebbe anche a ridurre l'incidenza o ad attenuare la manifestazione clinica dell'effetto collaterale degli aminobisfosfonati rappresentato dalla reazione di fase acuta, visto che i livelli sierici di 25(OH)D la modulano ⁴.

Cosa ne pensate?

Buona lettura

Bibliografia

- ¹ Fassio A, Adami G, Rossini M, et al. Pharmacokinetics of Oral Cholecalciferol in Healthy Subjects with Vitamin D Deficiency: A Randomized Open-Label Study. *Nutrients* 2020;12:1553. <https://doi.org/10.3390/nu12061553>.
- ² Adami G, Fassio A. Supplementazione con vitamina D: meglio giornaliera o con boli? *VitaminD UpDates* 2021;4:8-10. <https://doi.org/10.30455/2611-2876-2021-2>
- ³ Fassio A, Gatti D, Rossini M, et al. Effects on serum inflammatory cytokines of cholecalciferol supplementation in healthy subjects with vitamin D deficiency. *Nutrients* 2022;14:4823. <https://doi.org/10.3390/nu14224823>
- ⁴ Bertoldo F, Pancheri S, Zenari S, et al. Serum 25-hydroxyvitamin D levels modulate the acute-phase response associated with the first nitrogen-containing bisphosphonate infusion. *J Bone Miner Res* 2010;25:447-454. <https://doi.org/10.1359/jbmr.090819>